

Cause di sospensione

Elenco delle situazioni più frequenti che determinano l'esclusione temporanea dalla donazione di sangue ed emocomponenti.

- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di un anno:*
 - Allergie a farmaci (con particolare riguardo alla penicillina)
 - Dopo un parto, se è finito il periodo di allattamento
- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di sei mesi:*
 - Dopo guarigione da Toxoplasmosi
 - Dopo guarigione da Mononucleosi infettiva
 - Dopo interruzione di gravidanza
 - Soggetto asintomatico, di ritorno da soggiorno in zona ad endemia malarica, sia che abbia effettuato o meno profilassi per la malaria
- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio:*
 - Endoscopie (gastroscopie e colonscopie), colposcopie e artroscopie
 - Uso di catetere
 - Intervento chirurgico maggiore
 - Intervento di implantologia in odontoiatria
 - Intervento chirurgico non maggiore ma con anestesia generale o spinale
 - Piercing
 - Tatuaggi
 - Agopuntura (se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta).
 - Trasfusioni di sangue o di emocomponenti o trapianto di tessuti o cellule di origine umana
 - Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago
 - Somministrazione di immunoglobuline
 - Rapporti sessuali con persone infette o a rischio di infezioni da virus dell'epatite B, C o dell'AIDS
 - Soggetti a rischio dovuto a stretto contatto domestico con persone affette da epatite B
 - Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.
- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di tre mesi:*
 - Dopo viaggi in zone endemiche per malattie tropicali (sempre se il soggetto è asintomatico).
- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di quattro settimane:*
 - Vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite.

- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per il periodo di 48 ore:*
 - Vaccinazione contro epatite A e B, tetano, difterite, influenza, pertosse (il donatore non deve avere febbre né altri disturbi)
- *Situazioni che determinano il rinvio della donazione per periodi di tempo variabile:*
 - Cure odontoiatriche di minor entità. (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni).
Si rinvia la donazione di una settimana (o fino a guarigione di eventuali ferite) se gli interventi curativi sono stati eseguiti in ambiente idoneo da personale medico, seguendo le normative igieniche attuali (uso di materiale a perdere).
Se non si possono offrire tali garanzie igienico-sanitarie, si rinvia la donazione di quattro mesi dalla fine delle cure. Per l'implantologia si rimanda al punto 3)
 - Intervento chirurgico minore.
Si rinvia la donazione di una settimana
 - Influenza o episodi febbrili di breve durata.
Si aspetta a donare due settimane dalla fine dei disturbi
 - Allergie da pollini.
Si sospendono le donazioni per tutto il periodo dei sintomi